



MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLO SCOTCH-TEST (Test di Graham)

NB: vanno eseguiti 3 scotch-test preferibilmente a giorni alterni (vedi sotto)

RACCOMANDAZIONI:

- La raccolta va eseguita al momento del risveglio mattutino e prima che il soggetto si lavi o defechi.
- Utilizzare nastro adesivo (scotch) trasparente.
- ritirare i vetrini necessari in laboratorio.

MODALITÀ DI ESECUZIONE:

1. Tagliare con una forbice un pezzo di nastro adesivo poco più corto del vetrino fornito dal laboratorio.
2. Porre il nastro adesivo sulle pliche perianali e comprimere bene con le dita sulla pelle sottostante per circa 15-20 secondi.
3. Staccare il nastro adesivo e applicarlo ben steso sul vetrino fornito.
4. Numerare (I,II,III) e identificare i singoli vetrini (p.e. con le iniziali del nome e cognome del soggetto).
5. Lavarsi bene le mani a procedura eseguita.
6. Conservare i primi 2 vetrini in frigorifero per non più di 4 giorni. Il terzo vetrino va consegnato in laboratorio entro 2-4 ore dalla raccolta, insieme ai primi due conservati in frigorifero.
 - i. *NB: può essere più proficuo consegnare gli scotch-test anche uno alla volta, entro 2-4 ore dalle singole raccolte (alla prima positività sospendere le raccolte successive).*
7. Allegare sempre la scheda di richiesta specifica. Questa verrà compilata al momento della consegna in ambulatorio.

